


**Obwieszczenie Ministra Zdrowia
w sprawie listy leków
refundowanych
od 1 kwietnia 2025 r.**



Ministerstwo
Zdrowia

Liczba nowych terapii 2012-2025



Zmiany w refundacji
aptecznej

Zmiany w aktualnych
programach lekowych

Nowe bezpłatne leki dla
seniorów i kobiet w ciąży



Terapie
onkologiczne


10 terapii onkologicznych
objętych refundacją
(3 w chorobach rzadkich)

Terapie
nieonkologiczne


19 terapii nieonkologicznych
objętych refundacją
(4 w chorobach rzadkich)

Leki o ugruntowanej
skuteczności


Nowe terapie kardiologiczne
refundowane zgodnie
z artykułem 30a




Terapie onkologiczne




Imfinzi + Imjudo (*durwalumab + tremelimumab*)
Leczenie pierwszej linii niedrobnokomórkowego raka płuca



Alecensa (*alektynib*)
Leczenie pooperacyjne niedrobnokomórkowego raka płuca




Verzenios (*abemacyklib*)
Leczenie pooperacyjne wczesnego HER2-ujemnego raka piersi



Rubraca (*rukaparyb*)
**Leczenie nowo rozpoznanego zaawansowanego nawrotowego raka jajnika,
raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej**




Elrexfio (*elranatamab*)
Leczenie od czwartej linii szpiczaka plazmocytozy



Terapie onkologiczne



Talvey (*talkwetamab*)
Leczenie od czwartej linii szpiczaka plazmocytozowego




Talzenna (*talazoparyb*)
Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w skojarzeniu z enzalutamidem



Opdivo (*niwolumab*)
Leczenie uzupełniające czerniaka niwolumabem pacjentów od 12 r.ż.




Calquence (*akalabrutynib*)
**Leczenie pierwszej linii przewlekłej białaczki limfocytowej
(rozszerzenie o pacjentów low-risk – niskiego ryzyka)**




Jemperli (*dostarlimab*)
Leczenie pierwszej linii zaawansowanego lub nawrotowego raka endometrium




Terapie nieonkologiczne – programy lekowe




Kaftrio + Kalydeco (*iwakaftor + tezakaftor + eleksakaftor oraz iwakaftor*)
Leczenie pacjentów od 2 r. ż. z mukowiscydozą z co najmniej jedną mutacją F508DEL




Nucala (*mepolizumab*)
Leczenie dorosłych pacjentów z rozpoznaniem zespołu hipereozynofilowego (HES)




Nucala (*mepolizumab*)
Leczenie pacjentów od 6 r. ż. chorych na eozynofilową ziarniniakowość (EGPA)



Livtencity (*maribawir*)
Leczenie drugiej lub kolejnej linii pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych lub narządu łitego zakażonych wirusem CMV




Amvuttra (*wutrisiran*)
Leczenie dziedzicznej amyloidozy transtyretynowej przebiegającej z polineuropatią




Kinpeygo (*budesonid*)
Leczenie dorosłych pacjentów z pierwotną nefropatią IgA




Terapie nieonkologiczne – programy lekowe




Bewacyzumab (*różne nazwy handlowe leków*)
**Leczenie pacjentów z zakrzepem żył siatkówki BRVO (zamknięcie gałęzi żyły głównej)
i CRVO (zamknięcie żyły głównej)**




Epclusa (*sofosbuwir + welpataswir*)
Leczenia WZW typu C w populacji pediatrycznej



Harvoni (*sofosbuwir + ledipaswir*)
Leczenia WZW typu C w populacji pediatrycznej



Maviret (*glekaprewir + pibrentaswir*)
Leczenia WZW typu C w populacji pediatrycznej



Vosevi (*sofosbuvir + welpataswir + woksyleprewir*)
Leczenia WZW typu C w populacji pediatrycznej

Terapie nieonkologiczne – apteka




Abrysvo (*szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)*)
Profilaktyka zakażeń RSV u niemowląt poprzez zaszczepienie matki w okresie ciąży




Abrysvo (*szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)*)
Profilaktyka zakażeń RSV u pacjentów w wieku 60 lat i starszych



Shingrix (*szczepionka przeciw półpaścowi*)
Profilaktyka półpaśca i neuralgii półpaścowej u pacjentów w wieku 18 lat i starszych o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec




Tolutris (*telmisartan + amlodypina + hydrochlorotiazyd*)
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji (nadciśnienie tętnicze)




Vabinxo (*walsartan + indapamid*)
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji (nadciśnienie tętnicze)



Leki o ugruntowanej skuteczności



Iporel (*klonidyna*)
Nadciśnienie tętnicze



Zofenil (*zofenopril*)
Nadciśnienie tętnicze



Flecainide acetate Holsten (*flekainid*)
Zaburzenia rytmu serca



Leki dla seniorów i kobiet w ciąży

Wykaz bezpłatnych leków

65+

Abrysvo

szczepionka przeciw syncyotialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)

Shingrix

szczepionka przeciw półpaścowi

Tolutris

**telmisartan + amlodypina
+ hydrochlorotiazyd**

Vabinxo

walsartan + indapamid



Wykaz bezpłatnych leków

cięża+

Abrysvo

szczepionka przeciw syncyotialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)





Zmiany w programach lekowych

B.25 Leczenie pacjentów z mukopolisacharydozą typu II (zespół huntera)

→ zniesienia kryterium wiekowego stosowania idursulfazy

B.29 Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane

→ ujednoczenie kryteriów kwalifikacji kladrybiny analogicznie jak dla pozostałych leków stosowanych w pierwszej linii postaci rzutowo – remisyjnej stwardnienia rozsianego (RRMS).

B.59 Leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych

→ umożliwienie stosowania niwolumabu w leczeniu adjuwantowym czerniaka w stopniu zaawansowania IIB i IIC.

B.70 Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki

→ zmiana częstości podawania farycymabu – skrócenie czasu trwania fazy nasycającej z 4 miesięcy do 3.



Zmiany w programach lekowych

B.96 Leczenie chorych z nocną napadową hemoglobinurią (PNH)

→ skrócenie obowiązku podawania leku w ośrodku do 3 pierwszych podań, co umożliwia szybsze stosowanie leku w warunkach domowych oraz opcjonalne wykonywanie trepanobiopsji.

B.139 Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków → zmiana znacznika stosowanego w diagnostyce PET/CT i SPECT/CT oraz kryteria kwalifikacji (w części A oraz B) w zakresach czasu oceny stopnia zaawansowania choroby z zastosowaniem badań obrazowych.

B.155 Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)

→ wydłużenie okresu wykonywania wolumetrycznego MRI w pierwszych 2 latach do 6 miesięcy.

B.119 / C.89.d. Leczenie pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy

→ zmiana kategorii dostępności dla substancji czynnej sorafenib stosowanej w leczeniu zróżnicowanego raka tarczycy, z programu lekowego na katalog chemioterapii



Zmiany w refundacji aptecznej

Lurazydon oraz **brexpiprazol**

→ zmiana brzmienia wskazania refundacyjnego z uwagi na problemy z jednoznaczną interpretacją na:

*Schizofrenia u pacjentów od 13-go roku życia po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii **co najmniej jednym lekiem przeciwpsychotycznym II generacji.***

Metylfenidat

→ zmiana brzmienia wskazania refundacyjnego w zakresie psychoterapii jako elementu opieki kompleksowej nad pacjentem z ADHD na:

*Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD, wg ICD-10 F90) wyłącznie jako element kompleksowego **(zawierającego oddziaływania psychospołeczne)** leczenia u dzieci powyżej 6 r.ż.*

Haloperidol (w postaci doustnej)

→ uchylenie decyzji dla wskazania *We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji* (poziom odpłatności 30%) oraz pozostawienie wskazania *Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe* (poziom odpłatności- bezpłatnie do limitu) oraz wskazania pozarejestacyjnego pn. *Choroba Huntingtona* (poziom odpłatności 30%).

Zmiana wynika z nakładania się zakresów wskazań dla dotychczasowych poziomów odpłatności 30% i bezpłatnie do limitu.

Zdrowie Kobiet – nowe możliwości dzięki refundacji systemowej

